

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**Пара плюс**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название:** Пара плюс

**Лекарственная форма:** аэрозоль для наружного применения

**Состав** на 116 г

*Действующие вещества:*

Малатион 0,29 г

Перметрин 0,58 г

Пиперонилбутоксид 2,32 г

*Вспомогательные вещества:*

Изододекан 54,81г

Тетрафторэтан

(пропеллент HFA 134a) 58,0 г

**Описание:** Прозрачный маслянистый раствор с желтоватым оттенком, с легким характерным запахом. Распыляется в виде мелких частиц.

**Код АТХ:** P03AC54

**Фармакотерапевтическая группа:** средство для уничтожения эктопаразитов.

**Фармакологические свойства**

Фармакологическое действие обусловлено наличием компонентов, обладающих инсектицидным действием. Перметрин – нейротоксичный яд для насекомых. Пиперонилбутоксид усиливает действие перметрина. Малатион - органофосфорный инсектицид.

**Показания для применения**

Лечение педикулеза волосистой части головы (уничтожает вшей и гнид).

**Противопоказания для применения**

- Не применять у детей до 2,5 лет.
- Бронхиальная астма.
- Индивидуальная непереносимость.

#### **Способ применения и дозы**

Наружно.

- Кратковременными нажатиями препарат распыляют на кожу головы и на всю длину волос. После нанесения препарата подождать 10 минут, ничем не покрывая голову, затем тщательно вымыть голову шампунем.
- Мертвые гниды остаются прилипшими к волосам. Гниды вычесывают частой расческой.
- В случае обширного заражения необходимо повторить обработку через неделю.

#### **Меры предосторожности при применении**

- Препарат применять в хорошо проветриваемом помещении.
- Во время распыления и экспозиции препарата следует находиться вдали от огня
- Избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки. При случайном попадании в глаза тщательно промыть их теплой водой.

#### **Передозировка**

Нет данных о случаях передозировки.

#### **Побочные действия**

*Местные реакции:* очень редко возникает ощущение легкого пощипывания или жжения.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не выявлено.

#### **Особые указания**

Обработать все текстильные изделия, с которыми контактировал больной (подушки, головные уборы, воротники и т.д.), во избежание повторного заражения.

#### **Беременность и грудное вскармливание**

Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения препарата в периоды беременности и лактации не проводилось.

При беременности и лактации применение возможно, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

#### **Влияние на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами.**

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами.

**Форма выпуска**

Аэрозоль для наружного применения.

По 116 г препарата в алюминиевом баллоне, имеющим клапан непрерывного действия и распылитель из полимерных материалов.

Баллон вместе с инструкцией по применению помещается в картонную пачку.

**Срок годности**

4 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения**

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Условие отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения:**

Лаборатории Омега Фарма Франция

20 rue Andre Gide, 92320, Шатильон, Франция

**Производитель:**

Аэрофарм

468, шемин де Литорал 13016 Марсель, Франция

**Все претензии по качеству препарата направлять:**

Россия 123610 Москва,

Краснопресненская наб.12,

ЦМТ, «Международная-2», офис 747

тел.: (495) 258 20 06, факс (495) 258 20 07

Представитель фирмы

LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE

S.A.S. au Capital de 6 687 490 €

20, Rue Andre Gide

92320 CHATILLON

RCS Nanterre B 542 044 656-APE 244 C

Н.Л. Фер

